

العصفور الوردى - الجَزَم



Carpodacus synoicus Temminck, 1825

الإسم العلمى



Sinai Rosefinch

الإسم الدارج



Fringillidae

الفينش

العائلة



طائر صغير الحجم يتراوح طوله من (١٥,٥ - ١٦) سم و يزن من (١٧-٢٤).
جسم الذكر البالغ احمر وردى وجناحاه، يكتسب لونه الورد بعد عام من فقسه و
يصبح لونه أزهى و أجمل في موسم التزاوج .
الانثى و الطيور اليافعة فهي بنية رمادية

الوصف



المناطق الجبلية لجنوب سيناء، الاردن، السعودية، أفغانستان، الصين، إسرائيل.

أماكن التواجد



اقل تهديد - حيث انه واسع الانتشار.

الحالة



أبلق أسود أبيض الرأس - البقعاء



Oenanthe leucopyga Brehm CL, 1855

الإسم العلمي



White crowned black wheatear

الإسم الدارج



Turdidae

الشحرورية

العائلة



طوله يصل الي ١٧ سم.
شكلها مميز و ذلك لوجود ذيلها و اردافها البيضاء.
الطيور البالغة لها تاج أبيض بينما اليافع منها لا تكتسب التاج الابيض إلا عند بلوغها.

الوصف



مصر (جبال سيناء، بحيرة ناصر، الصحراء الشرقية، واحات الصحراء الغربية)،
الأردن، الجزائر، إثيوبيا، ليبيا، فلسطين، إسرائيل.

أماكن التواجد




اقل تهديد - حيث انه واسع الانتشار.

الحالة



حمام جبلي



Columba livia Gmelin, 1789

الإسم العلمي



Rock Dove, Rock Pigeon

الإسم الدارج



Columbidae

الحمامية

العائلة



الوصف



البالغ منه يصل من ٣٢ الي ٣٧ سم مع طول جناحين ١٢-١٤ سم.
رمادي مزرق الراس و العنق، الصدر مصفر اللون مصقول مع الاخضر والارجواني المحمر.
متقزح اللون علي طول الرقبة و ريش الجناح التقزح لونه برتقالي او احمر او ذهبي،
الجلد حول العين رمادي مزرق، المنقار رمادي - أسود مع اللون الابيض.
الاناث البالغات تكاد تكون مطابقا للذكور ، ولكن التقزح اللوني على العنق أقل كثافة
وأكثر تقبيدا إلى العمق والجانبين.
اسفل الظهر ابيض، لديه شريطين اسودين علي جناحه، يوجد عصابة سوداء علي
اخر الذيل. القدم لونها أحمر وردي.
ينتاسل الحمام في اي وقت من السنه و لكن انسب اوقاته هي الربيع و الصيف
تقاسم حضانة الوالدين للبيض من سبعة عشر الي تسعة عشر يوميا.

يعيش في المناطق الجبلية و الصحراوية و علي طول البحر الابيض.
سلسلة جبال البحر الاحمر، جبل علبة.

أماكن التواجد



الحالة



مقيم شائع.



يمام بلدي



Streptopelia senegalensis Linnaeus, 1766

الإسم العلمي

Laughing Dove

الإسم الدارج

Columbidae

الحمامية

العائلة

طويل الذيل ضئيلة الحجم ، عادة ٢٥ سنتيمترا في الطول. الظهر، الاجنحة، والذيل لونهم احمر مائل الى البني مع الازرق والرمادي في الاجنحة. الرأس و الاجزاء السفلية وردية اللون مع ظلال بيضاء اسفل البطن. يقع سوداء علي الحلق. سيقان حمراء.

الوصف

واحات الصحراء الغربية ما عدا الفريرا، وادي النطرون، سيوة، الخارجة، منطقة قناة السويس، ابو سمبل، العين السخنة، راس غريب، الغردق، سفاجا، قصير، جبل علبة، العريش، رفح، خليج العقبة، نويبع، وادي فيران، وادي الشيخ، سانت كاترين، خليج السويس.

أماكن التواجد

مقيم شائع.

الحالة



أبلق حزين



Oenanthe lugens Lichtenstein, 1823

الإسم العلمي



Mourning Wheatear

الإسم الدارج



Turdidae

الشرورية

العائلة



يتميز بلونه الابيض والاسود ووجود لون برتقالي فاتح اسفل البطن عند بداية الذيل.

الوصف



الصحراء الشرقية، سيناء، الدلتا و وادي النيل مثل الجيزة و ابو رواش، مطروح.

أماكن التواجد



مقيم شائع.

الحالة



قنبرة البادية – قنبرة الصحراء



Ammomanes deserti Lichtenstein, 1823

الإسم العلمي



Desert Lark, Middle-eastern Desert Lark

الإسم الدارج



Alaudidae

القنبرية

العائلة



يصل طولها الي ١٥ سم، يتشابه لون ريش قنبرة الصحراء مع لون رمال الصحراء ؛ مما يشكّل تمويهها هائلاً، تبني قنبرة الصحراء عشها فوق الصخور أو فوق تجمعات الحشائش ، ثم تضع فيه (٣ بيضات)، وترقد عليهم حتى يخرج الصغار.

الوصف



تتواجد قنبرة الصحراء،الوديان الصخرية، منحدرات الجبال والمنحدرات العشبية الجافة.

أماكن التواجد



الصحراء الغربية، الدلتا ووادي النيل، الصحراء الشرقية، سيناء.

مقيم شائع.

الحالة



بومة بقرون - بعف



Bubo bubo Linnaeus, 1758

الإسم العلمى

Eagle Owl, Pharaoh Eagle Owl

الإسم الدارج

Strigidae

البوم

العائلة

بومة كبيرة وقوية (تعتبر من أكبر البوم عالميا)، يصل طولها الى ٥٨-٧١ سم وتزن الأنثى ٢٢٨٠-٤٢٠٠ جم والذكر ١٦٢٠-٣٠٠٠ جم ويصل طول الجناح الواحد للأنثى ٤٧ سم و ٤٤ سم للذكر. الأجزاء العليا بنية وأسود اللون أو أسود مصفر من أعلى، ويمكن تمييزها عن طريق أعينها الكبيرة البرتقالية اللون الملفتة للنظر وبأن لها خصلة واضحة بنية أو سوداء عند الأذن. أجزائها العليا أكثر قتامة من أجزائها السفلى والتي تحتوى على شرائط سوداء ولها حلق لونه أبيض. تتغذى على الثدييات الصغيرة.

الوصف

يعيش فى معظم البيئات من الغابات الى الصحراء الدافئة وأحيانا تفضل الأماكن الصخرية. الصحراء الشرقية والغربية ودلتا النيل والوادي وسيناء.

أماكن التواجد

الحالة

منتشر ومقيم.



غراب نوحى



Corvus ruficollis Lesson, 1831

الإسم العلمى



Desert raven, Brown necked raven

الإسم الدارج



Corvidae

الغربان

العائلة



طائر كبير أسود يصل طوله الى ٥٢-٥٦ سم، يشبه الغراب المنتشر لكن منقارها ليس كبير أو عميق وأجنحتها أكثر إستدقافا. الرأس والحلق سوداء بنية وهو ما يميز هذا النوع (سبب التسمية الشائعة لهذا الغراب باللغة الإنجليزية) بينما بقية ريش أسود لامع يتخلله القليل من الريش الأرجواني والأزرق. كل من القدمين والساقين والمنقار أسود اللون. يبني عشه على التلال و الجروف الصخرية.

الوصف



معظم المناطق الصحراوية بمصر.

أماكن التواجد



منتشر ومقيم.

الحالة



صقر الغروب



Falco concolor Temminck, 1825

الإسم العلمى



Sooty Falcon

الإسم الدارج



Falconidae

الصقور

العائلة



طائر جذاب ومتوسط الحجم، له أجنحة وذيل طويلان. الريش شاحب ورمادي اللون ومشوب بالزرقة في الذكور بينما يكون أكثر قتامة في الإناث. المنطقة تحت العينين أغمق من باقي الجسم بشكل ملحوظ، وبعض الأفراد بها قطعة صغيرة باهتة في الحلق. على العكس من الريش، فإن المناطق الجرداء على الساقين وحول قاعدة المنقار وحافة حول العينين لونها أصفر.

الوديان الصخرية والصحراوية (المناطق المتميزة بوجود درجة حرارة عالية ورطوبة منخفضة).

منتشر (الساحل الشمالى بالصحراء الشرقية والدلتا والوادي والصحراء الشرقية وساحل البحر الأحمر وسيناء).

منتشر محليا، مهاجر، مقيم من منتصف أبريل الى آخر نوفمبر. عالميا مهدد جدا وتحت الخطر.

الوصف



أماكن التواجد



الحالة

